



## ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного средства

### ГЕПАТОФИТ

#### Состав:

*действующие вещества:* 1 упаковка (100 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья:  
фасоли створок плодов  
(*Phaseoli fructus (sine semine)*) ..... 12 г,  
одуванчика лекарственного корней  
(*Taraxaci officinalis radix*) ..... 12 г,  
бессмертника песчаного цветков  
(*Helichrysi arenarii flos*) ..... 12 г,  
шиповника плодов  
(*Rosae pseudo-fructus*) ..... 12 г,  
кукурузы столбиков с рыльцами  
(*Zea mays stili cum stigmatibus*) ..... 11 г,  
ноготков цветков  
(*Calendulae flos*) ..... 11 г,  
галеги лекарственной травы  
(*Galegae herba*) ..... 10 г,  
крапивы листьев (*Urticae folium*) ..... 10 г,  
расторопши плодов  
(*Silybi mariani fructus*) ..... 10 г.

#### Лекарственная форма. Сбор.

*Основные физико-химические свойства:* смесь кусочков различной формы серовато-зеленого цвета с коричневато-красными, желтыми и белыми включениями. Запах приятный.

#### Фармакотерапевтическая группа.

Средства, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей.

Код АТХ А05.

#### Фармакологические свойства.

##### Фармакодинамика.

ГЕПАТОФИТ способствует восстановлению клеток печени (гепатоцитов), улучшает антиоксидантную функцию печени, усиливает желчеотделение, снижает тонус желчного пузыря и желчевыводящих путей, повышает концентрацию желчных кислот и уменьшает концентрацию холестерина. Умеренно способствует снижению уровня сахара в крови.

#### Клинические характеристики.

**Показания.** В составе комплексной терапии заболеваний печени и желчевыводящих путей (хронический гепатит, хронический холецистит, холангит, дискинезия желчевыводящих путей по гипотоническому типу); в составе комплексной терапии сахарного диабета.

**Противопоказания.** Артериальная гипертензия III ст., обтурационная желтуха, желчнокаменная болезнь с наличием камней более 10 мм в диаметре, пониженный уровень сахара в крови, острый вирусный гепатит, тромбоз вен, повышенная свертываемость крови, острые отравления различной этиологии; повышенная чувствительность к каким-либо компонентам препарата или другим растениям семейства астровых (Compositae/Asteraceae).

**Особые меры безопасности.** Следует с осторожностью применять больным с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, циррозом печени, острым гепатитом, острым холециститом и острым панкреатитом; с хроническим панкреатитом или энтероколитом в фазе обострения.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.** Не установлено.

#### Особенности применения.

**Применение в период беременности или кормления грудью.** Данные относительно безопасности и эффективности применения препарата в период беременности или кормления грудью отсутствуют, поэтому его не следует назначать в этот период.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.** Препарат не влияет на способность управлять автотранспортом или работать с другими механизмами, но пациентам с существующими вестибулярными нарушениями следует соблюдать осторожность до выяснения индивидуальной реакции.

**Способ применения и дозы.** 2 столовые ложки сбора заварить в 500 мл кипятка, настоять в закрытой посуде в течение 1 часа, процедить. Взрослым и детям с 7 лет принимать в теплом виде по 1/3 стакана (150 мл) за 20-30 минут до еды 3 раза в сутки.

Длительность применения устанавливает врач. Обычно курс лечения не превышает 4 недели. При необходимости по назначению врача курс лечения можно повторить.

**Дети.** Препарат противопоказан детям до 7 лет.

**Передозировка.** Возможно усиление проявлений побочных реакций.

**Побочные реакции.** Препарат обычно хорошо переносится пациентами. Однако, учитывая многокомпонентный состав препарата, в отдельных случаях, как правило, при индивидуальной гиперчувствительности к какому-либо компоненту препарата или при нарушении рекомендованного режима приема возможно развитие таких побочных реакций:

*со стороны пищеварительной системы:* тошнота, рвота, диспепсия, изжога, легкая диарея;

*со стороны дыхательной системы:* одышка;

*со стороны мочевыделительной системы:* усиление диуреза;

*со стороны кожи:* аллергические реакции, в том числе зуд, гиперемия, отек кожи;

*другие:* усиление существующих вестибулярных нарушений.

В случае появления каких-либо негативных реакций необходимо обратиться к врачу.

**Срок годности.** 2 года. Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения.** В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С и недоступном для детей месте.

**Упаковка.** По 100 г в пакете, вложенном в пачку.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

**Производитель.** ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.** Украина, 61091, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20 лит. «А-5».

**Дата последнего пересмотра.** 14.12.2015.



**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**  
**ГЕПАТОФІТ**

**Склад:**

діючі речовини: 1 упаковка (100 г) містить суміш лікарської рослинної сировини:

квасолі стюлок плодів ( <i>Phaseoli fructus (sine semine)</i> )	12 г,
кульбаби лікарської коренів ( <i>Taraxaci officinalis radix</i> )	12 г,
цимну піщаного квіток ( <i>Helichrysi arenarii flos</i> )	12 г,
шипшини плодів ( <i>Rosae pseudo-fructus</i> )	12 г,
кукурудзи стовпчиків з приймочками ( <i>Zea mays styli cum stigmatidis</i> )	11 г,
нагідок квіток ( <i>Calendulae flos</i> )	11 г,
галеги лікарської трави ( <i>Galegae herba</i> )	10 г,
кропиви листя ( <i>Urticae folium</i> )	10 г,
розторопші плодів ( <i>Silybi mariani fructus</i> )	10 г.

**Лікарська форма.** Збір.

**Основні фізико-хімічні властивості:** суміш шматочків різної форми сірувато-зеленого кольору з коричнювато-червоними, жовтими і білими включеннями. Запах присмний.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що застосовуються при захворюваннях печінки та жовчовивідних шляхів.  
Код АТХ А05.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакокінетика.**

ГЕПАТОФІТ сприяє відновленню клітин печінки (гепатоцитів), поліпшує антиоксидантну функцію печінки, посилює жовчовиділення, знижує тону жовчного міхура і жовчовивідних шляхів, підвищує концентрацію жовчних кислот і зменшує концентрацію холестерину. Помірно сприяє зниженню рівня цукру в крові.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.** У складі комплексної терапії захворювань печінки та жовчовивідних шляхів (хронічний гепатит, хронічний холецистит, холангіт, дискінезія жовчовивідних шляхів за гіпотонічним типом); у складі комплексної терапії цукрового діабету.

**Протипоказання.** Артеріальна гіпертензія III ст., обтураційна жовтяниця, жовчнокам'яна хвороба з наявністю каменів більше 10 мм у діаметрі, знижений рівень цукру в крові, гострий вірусний гепатит, тромбофлебіт, підвищене згортання крові, гострі отруєння різної етіології; підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату або інших рослин родини айстрових (Compositae/Asteraceae).

**Особливі заходи безпеки.** Слід з обережністю застосовувати хворим на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки у стадії загострення, цироз печінки, гострий гепатит, гострий холецистит та гострий панкреатит; на хронічний панкреатит або ентероколіт у фазі загострення.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Не встановлено.

**Особливості застосування.**

Застосування у період вагітності або годування груддю. Дані щодо безпеки та ефективності застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутні, тому його не слід призначати у цей період.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.** Препарат не впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами, але пацієнтам з існуючими вестибулярними порушеннями слід дотримуватися обережності до з'ясування індивідуальної реакції.

**Спосіб застосування та дози.** 2 столові ложки збору заварити у 500 мл окропу, настояти у закритому посуді протягом 1 години, процідити. Дорослим та дітям віком від 7 років приймати у теплому вигляді по  $\frac{1}{3}$  склянки (150 мл) за 20-30 хвилин до їди 3 рази на добу.

Тривалість застосування визначає лікар. Зазвичай курс лікування не перевищує 4 тижнів. При необхідності за призначенням лікаря курс лікування можна повторити.

**Діти.** Препарат протипоказаний дітям віком до 7 років.

**Передозування.** Можливе посилення проявів побічних реакцій.

**Побічні реакції.** Препарат зазвичай добре переноситься пацієнтами. Однак, враховуючи багатоконпонентний склад препарату, в окремих випадках, як правило, при індивідуальній гіперчутливості до будь-якого компонента препарату або при порушенні рекомендованого режиму прийому можливий розвиток таких побічних реакцій:

з боку травної системи: нудота, блювання, диспепсія, печія, легка діарея;

з боку дихальної системи: задишка;

з боку сечовидільної системи: посилення діурезу;

з боку шкіри: алергічні реакції, у тому числі свербіж, гіперемія, набряк шкіри;

інші: посилення існуючих вестибулярних порушень.

У випадку появи будь-яких негативних реакцій необхідно звернутися до лікаря.

**Термін придатності.** 2 роки. Не застосовувати після завершення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 100 г у пакеті, вкладеному в пачку.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.** ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕІМ».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.** Україна, 61091, Харківська обл., м. Харків, вул. Харківських дивізій, 20 літ. «А-5».

**Дата останнього перегляду.** 14.12.2015.