



## ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного средства

### НЕФРОФИТ

#### Состав:

*действующие вещества:* 1 упаковка (100 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья:

бузины цветков ( <i>Sambuci flos</i> )	9 г,
подорожника большого листьев ( <i>Plantaginis majoris folium</i> )	9 г,
спорыша травы ( <i>Polygoni avicularis herba</i> )	9 г,
хвоща травы ( <i>Equiseti herba</i> )	9 г,
пастушьей сумки травы ( <i>Bursae pastoris herba</i> )	8 г,
кукурузы столбиков с рыльцами ( <i>Zea mays styli cum stigmatibus</i> )	8 г,
одуванчика лекарственного корней ( <i>Taraxaci officinalis radix</i> )	8 г,
лопуха корней ( <i>Arctii radix</i> )	8 г,
толокнянки листьев ( <i>Uvae ursi folium</i> )	8 г,
мяты перечной листьев ( <i>Menthae piperitae folium</i> )	8 г,
ромашки цветков ( <i>Matricariae flos</i> )	8 г,
череды травы ( <i>Bidentis herba</i> )	8 г.

#### Лекарственная форма. Сбор.

*Основные физико-химические свойства:* смесь кусочков различной формы серовато-зеленого цвета с буровато-красными, желтыми и белыми включениями. Запах сильный, приятный.

**Фармакотерапевтическая группа.** Средства, применяемые в урологии. Код АТХ G04B X.

#### Фармакологические свойства.

##### Фармакодинамика.

НЕФРОФИТ оказывает мочегонное действие и повышает азотовыделительную функцию почек, имеет легкое салуретическое действие, то есть способствует в некоторой степени выведению солей. Положительно влияет на мочевинообразовательную функцию печени и очистительную функцию почек. Обладает спазмолитическим, противовоспалительным и антибактериальным действием.

#### Клинические характеристики.

**Показания.** Комплексное лечение и профилактика обострений воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих путей, которые сопровождаются снижением мочевого выделительной и азотовыделительной функций, мочекаменной болезнью, отеков.

**Противопоказания.** Гастропатия с повышенной секрецией, хроническая почечная недостаточность, язвенная болезнь желудка в стадии обострения, обтурационная желтуха, желчекаменная болезнь с наличием камней более 10 мм в диаметре, острый холецистит, острый гепатит, цирроз печени, обструкция желчевыводящих путей, тромбоз, круп, анорексия; повышенная чувствительность к каким-либо компонентам препарата.

**Особые меры безопасности.** Следует с осторожностью применять при повышенной свертываемости крови, а также больным бронхиальной астмой, спазмофилией.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.** Не установлено.

#### Особенности применения.

**Применение в период беременности или кормления грудью.** В связи с отсутствием достаточного опыта применения препарата в период беременности его следует применять по назначению врача в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для развития плода. При необходимости применения препарата следует прекратить кормление грудью.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.** Не влияет.

**Способ применения и дозы.** 2 столовые ложки сбора заварить в 500 мл кипятка, настоять в закрытой посуде в течение 1 часа, процедить. Взрослым и детям с 7 лет принимать в теплом виде по  $\frac{1}{3}$  стакана (150 мл) за 20-30 минут до еды 3 раза в сутки.

Длительность применения определяет врач. Обычно курс лечения длится до 2 месяцев. При необходимости по назначению врача курс лечения можно повторить с интервалом 3-4 недели.

**Дети.** Препарат противопоказан детям до 7 лет.

**Передозировка.** Возможно появление симптомов диспепсии и усиление проявлений побочных реакций.

**Побочные реакции.** Препарат обычно хорошо переносится пациентами. Однако, учитывая многокомпонентный состав препарата, в отдельных случаях, как правило, при индивидуальной гиперчувствительности к какому-либо компоненту препарата или нарушении рекомендованного режима его приема возможно развитие аллергических реакций, в том числе гиперемия, сыпь, зуд, ангионевротический отек, контактный дерматит, крапивница.

Из литературных источников известно, что применение листьев толокнянки может вызвать болевые ощущения в области поясницы, изменение цвета мочи, а также боль в конце мочеиспускания. Несмотря на то, что сбор НЕФРОФИТ содержит небольшое количество листьев толокнянки, подобные проявления не исключены. В случае появления каких-либо негативных реакций необходимо обратиться к врачу.

**Срок годности.** 2 года. Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения.** В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C и недоступном для детей месте.

**Упаковка.** По 100 г в пакете, вложенном в пачку.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

**Производитель.** ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ».

**Местонахождение производителя и его адреса осуществления деятельности.** Украина, 61091, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20 лит. «А-5».

**Дата последнего пересмотра.** 26.10.2015.



## ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу

### НЕФРОФІТ

#### Склад:

діючі речовини: 1 упаковка (100 г) містить суміш лікарської рослинної сировини:

бузини квіток ( <i>Sambuci flos</i> )	9 г,
подорожника великого листя ( <i>Plantaginis majoris folium</i> )	9 г,
споришу трави ( <i>Polygoni avicularis herba</i> )	9 г,
хвоща трави ( <i>Equiseti herba</i> )	9 г,
грициків звичайних трави ( <i>Bursae pastoris herba</i> )	8 г,
кукурудзи стовпчиків з приймочками ( <i>Zeaе maydis styli cum stigmatiс</i> )	8 г,
кульбаби лікарської коренів ( <i>Taraxaci officinalis radix</i> )	8 г,
лопуха коренів ( <i>Arctii radix</i> )	8 г,
мучниці листя ( <i>Uvae ursi folium</i> )	8 г,
м'яти перцевої листя ( <i>Menthae piperitae folium</i> )	8 г,
ромашки квіток ( <i>Matricariae flos</i> )	8 г,
череди трави ( <i>Bidentis herba</i> )	8 г.

#### Лікарська форма. Збір.

Основні фізико-хімічні властивості: суміш шматочків різної форми сірвато-зеленого кольору з бурувато-червоними, жовтими і білими включеннями. Запах сильний, приємний.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що застосовуються в урології. Код АТХ G04B X.

#### Фармакологічні властивості.

##### Фармакодинаміка.

НЕФРОФІТ проявляє сечогінну дію та підвищує азотовидільну функцію нирок, має легку салуретичну дію, тобто сприяє деякою мірою виведенню солей. Позитивно впливає на сечовиноувтворювальну функцію печінки і очисну функцію нирок. Має спазмолітичну, протизапальну та антибактеріальну дію.

#### Клінічні характеристики.

**Показання.** Комплексне лікування та профілактика загострень запальних захворювань нирок та сечовивідних шляхів, які супроводжуються зниженням сечовидільної та азотовидільної функції, сечокам'яною хворобою, набряком.

**Протипоказання.** Гастропатія з підвищеною секрецією, хронічна ниркова недостатність, виразкова хвороба шлунка у стадії загострення, обтураційна жовтяниця, жовчокам'яна хвороба з наявністю каменів понад 10 мм у діаметрі, гострий холецистит, гострий гепатит, цироз печінки, обструкція жовчовивідних шляхів, тромбоемболія, круп, анорексія; підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату.

Особливі заходи безпеки. Слід з обережністю застосовувати при підвищеному згортанні крові, а також хворим на бронхіальну астму, спазмофілію.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Не встановлено.

#### Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю. У зв'язку з відсутністю достатнього досвіду застосування препарату у період вагітності його слід застосовувати за призначенням лікаря у випадках, коли очікувана користь для матері

перевищує потенційний ризик для розвитку плода. При необхідності застосування препарату слід припинити годування груддю.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.** Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.** 2 столові ложки збору заварити у 500 мл окропу, настояти у закритому посуді протягом 1 години, процідити. Дорослим та дітям віком від 7 років приймати у теплому вигляді по  $\frac{1}{3}$  склянки (150 мл) за 20-30 хвилин до їди 3 рази на добу.

Тривалість застосування визначає лікар. Зазвичай курс лікування триває до 2 місяців. При необхідності за призначенням лікаря курс лікування можна повторити з інтервалом у 3-4 тижні.

**Діти.** Препарат протипоказаний дітям віком до 7 років.

**Передозування.** Можливе виникнення симптомів диспепсії та посилення проявів побічних реакцій.

**Побічні реакції.** Препарат зазвичай добре переноситься пацієнтами. Однак, враховуючи багатоконпонентний склад препарату, в окремих випадках, як правило, при індивідуальній гіперчутливості до будь-якого компонента препарату або порушенні рекомендованого режиму його прийому можливий розвиток алергічних реакцій, у тому числі гіперемія, висипи, свербіж, ангіоневротичний набряк, контактний дерматит, кропив'янка.

З літературних джерел відомо, що застосування листя мучниці може спричинити больові відчуття у ділянці попереку, зміну кольору сечі, а також біль у кінці сечовипускання. Незважаючи на те, що збір НЕФРОФІТ містить невелику кількість листя мучниці, подібні прояви не виключені.

У випадку появи будь-яких негативних реакцій необхідно звернутися до лікаря.

**Термін придатності.** 2 роки. Не застосовувати після завершення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 100 г у пакеті, вкладеному в пачку.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.** ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.** Україна, 61091, Харківська обл., м. Харків, вул. Харківських дивізій, 20 літ. «А-5».

**Дата останнього перегляду.** 26.10.2015.