



ГИНЕКОФИТ

Настойка сложная

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Прочитайте внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение препарата!

Храните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его снова.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, обязательно проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Состав лекарственного средства:

действующие вещества: 1 мл настойки сложной содержит биологически активные вещества из смеси растительного сырья:

травы барвинка малого	0,020 г;	травы тысячелистника	0,024 г;
корневищ аира	0,022 г;	травы пастушьей сумки	0,024 г;
цветков ромашки	0,024 г;	травы душицы	0,022 г;
травы зверобоя	0,020 г;	цветков ноготков	0,024 г;
травы чистотела	0,020 г;		

вспомогательные вещества: спирт этиловый 70%.

Лекарственная форма. Настойка сложная.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые в гинекологии.

Фармакологические свойства. Препарат обладает противовоспалительным, ранозаживляющим действием, а также гемостатической активностью. Препарат оказывает умеренное антибактериальное действие.

Показания. ГИНЕКОФИТ применяют в гинекологии в комплексной терапии кольпитов, вульвовагинитов, вульвитов, эрозий шейки матки и эндоцервицитов, цервицитов, сальпингооофоритов, а также при гиперполименорее. Препарат используют также с целью профилактики воспалительных заболеваний половой системы у женщин.

Противопоказания. При обоих путях применения: индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата; при приеме внутрь: беременность, период кормления грудью, хронический алкоголизм, чувствительность к алкоголю, гиперацидные состояния, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, цирроз печени, прием нейролептиков и транквилизаторов, детский возраст до 12 лет.

Предостережения при применении. *Перед применением взболтать.* В период применения препарата внутрь следует избегать потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстрых двигательных и психических реакций (управление транспортными средствами и работа с механизмами).

Взаимодействие с лекарственными средствами. Так как препарат ГИНЕКОФИТ содержит спирт этиловый 70%, возможно потенцирование действия снотворных и седативных препаратов, транквилизаторов.

Способ применения и дозы. *Если Вы принимаете какие-либо другие лекарственные средства, обязательно сообщите об этом Вашему врачу.* ГИНЕКОФИТ назначают в виде вагинальных промываний и орошений 1 раз в сутки ежедневно в течение 2 – 3 недель в зависимости от течения заболевания. Для этого 1 ст. ложку настойки разводят в 250 мл теплой воды (35 – 38 °С). При острых формах заболеваний, для усиления терапевтического эффекта, наряду с местным лечением целесообразно применять ГИНЕКОФИТ внутрь из расчета 5 – 10 мл (1 – 2 чайные ложки) на 80 – 100 мл (1/3 – 1/2 стакана) воды после еды 2 – 3 раза в сутки. При эрозиях шейки матки назначают вагинальные тампоны с препаратом в разведении 1:20 или 1:10.

Продолжительность приема зависит от характера патологического процесса, его выраженности, характера комплексной фармакотерапии. Курс лечения составляет от 10 до 28 дней.

С целью профилактики рецидивов ГИНЕКОФИТ применяется в виде вагинальных промываний и орошений 1 раз в сутки ежедневно в разведении 1:20 (1 ст. ложка на 200 мл теплой воды (35 – 38 °С)). Длительность курса устанавливает врач.

Ни в коем случае не превышайте дозу и продолжительность приема препарата, указанную в листке-вкладыше или назначенную Вам врачом!

Побочные эффекты. Возможны аллергические реакции. *В случае появления каких-либо необычных реакций, проконсультируйтесь с Вашим врачом.*

Срок годности. 2 года. Лекарственное средство не следует применять после окончания указанного на упаковке срока годности.

Условия хранения. Хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С. Допускается наличие осадка.

Упаковка. По 100 мл в банках стеклянных; по 100 мл в банках полимерных; по 100 мл во флаконах полимерных.

Правила отпуска. Без рецепта.

Название и адрес производителя. ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ». Украина, 61091, г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20.



ГІНЕКОФІТ

Настойка складна

ЛИСТОК-ВКЛАДИШ. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТА

*Прочитайте уважно цей листок-вкладиш перед тим, як розпочати застосування препарату!
Зберігайте цей листок-вкладиш. Вам може знадобитися перечитати його знову.
Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, обов'язково проконсультуйтеся з Вашим лікарем.*

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 мл настойки складної містить біологічно активні речовини з суміші рослинної сировини:

трави барвінку малого	0,020 г;	трави деревію	0,024 г;
кореневищ айру	0,022 г;	трави грициків звичайних	0,024 г;
квіток ромашки	0,024 г;	трави материнки	0,022 г;
трави звіробою	0,020 г;	квіток нагідок	0,024 г;
трави чистотілу	0,020 г;		

допоміжні речовини: спирт етиловий 70%.

Лікарська форма. Настойка складна.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються в гінекології.

Фармакологічні властивості. Препарат має протизапальну, ранозагоювальну дію, а також гемостатичну активність. Препарат виявляє помірну антибактеріальну дію.

Показання. ГІНЕКОФІТ застосовують у гінекології при комплексній терапії кольпітів, вульвовагінітів, вульвітів, ерозій шийки матки та ендометритів, цервіцитів, сальпінгоофоритів, а також при гіперполіменорей. Препарат також використовують з метою профілактики запальних захворювань статевої системи у жінок.

Протипоказання. При обох шляхах застосування: підвищена чутливість до компонентів препарату; при прийомі всередину: вагітність, період годування груддю, хронічний алкоголізм, чутливість до алкоголю, гіперацидні стани, виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки, цироз печінки, прийом нейролептиків і транквілізаторів, дитячий вік до 12 років.

Застереження при застосуванні. *Перед застосуванням збовтати.* У період застосування препарату внутрішньо варто утримуватися від потенційно небезпечних видів діяльності, що потребують підвищеної уваги та швидких рухових і психічних реакцій (керування транспортними засобами та робота з механізмами).

Взаємодія з лікарськими засобами. Оскільки препарат ГІНЕКОФІТ містить спирт етиловий 70%, можливе потенціювання дії снодійних та седативних препаратів, транквілізаторів.

Спосіб застосування та дози. *Якщо Ви приймаєте будь-які інші лікарські засоби, обов'язково повідомте про це Вашого лікаря.* ГІНЕКОФІТ призначають у вигляді вагінальних промивань та зрошувань 1 раз на добу шодня протягом 2 – 3 тижнів залежно від перебігу захворювання. Для цього 1 ст. ложку настойки розводять в 250 мл теплої води (35 – 38 °С). При гострих формах захворювань, для посилення терапевтичного ефекту, одночасно з місцевим лікуванням доцільно застосовувати ГІНЕКОФІТ внутрішньо з розрахунку 5 – 10 мл (1 – 2 чайні ложки) на 80 – 120 мл (1/3-1/2 склянки) води після їжі 2 – 3 рази на добу. При ерозіях шийки матки призначають вагінальні тампони з препаратом у розведенні 1:20 або 1:10.

Тривалість прийому залежить від характеру патологічного процесу, його вираженості, характеру комплексної фармакотерапії. Курс лікування становить від 10 до 28 днів.

З метою профілактики рецидивів ГІНЕКОФІТ застосовується у вигляді вагінальних промивань та зрошувань 1 раз на добу шодня в розведенні 1:20 (1 ст. ложку настойки розводять в 200 мл теплої води (35 – 38 °С)). Тривалість курсу визначає лікар.

Ні в якому разі не перевищуйте дозу та тривалість прийому препарату, зазначену в листку-вкладиші або призначену Вам лікарем!

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції. *У випадку появи будь-яких незвичних реакцій проконсультуйтеся з Вашим лікарем.*

Термін придатності. 2 роки. Лікарський засіб не слід застосовувати після закінчення зазначеного на упаковці терміну придатності.

Умови зберігання. Зберігати в захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Допускається наявність осаду.

Упаковка. По 100 мл у банках скляних; по 100 мл у банках полімерних; по 100 мл у флаконах полімерних.

Правила відпуску. Без рецепта.

Назва та адреса виробника. ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ». Україна, 61091, м. Харків, вул. Харківських дивізій, 20.