



## ПРОСТАТОФИТ

Настойка сложная

### ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

*Внимательно прочитайте этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение препарата!  
Храните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его.*

*Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, обязательно проконсультируйтесь с Вашим врачом.*

#### Состав лекарственного средства:

*действующие вещества:* 1 мл настойки сложной содержит биологически активные вещества из смеси растительного сырья:

корней крапивы .....	0,04 г;	травы пустырника .....	0,02 г;
корневищ аира .....	0,02 г;	почек березовых .....	0,02 г;
цветков ромашки .....	0,02 г;	плодов софоры японской .....	0,02 г;
травы донника .....	0,02 г;	листьев шалфея .....	0,02 г;
травы чистотела .....	0,02 г;		

*вспомогательные вещества:* спирт этиловый 70%.

**Лекарственная форма.** Настойка сложная.

**Фармакотерапевтическая группа.** Средства, применяемые при доброкачественной гипертрофии предстательной железы.

**Фармакологические свойства.** Комбинация биологически активных веществ препарата ПРОСТАТОФИТ влияет на обмен веществ в предстательной железе и корректирует уродинамику. ПРОСТАТОФИТ обладает противовоспалительным, анальгетическим и спазмолитическим действием, а также умеренной антиандрогенной активностью при повышенном (но не нормальном) уровне андрогенов.

**Показания.** ПРОСТАТОФИТ применяют для лечения хронических простатитов, в комплексной терапии начальной стадии доброкачественной гиперплазии предстательной железы, а также неспецифических воспалительных заболеваний мочевыводящих путей; для профилактики нарушений функции предстательной железы и уродинамики, обусловленных возрастом.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам препарата. При приеме внутрь: хронический алкоголизм, непереносимость алкоголя, гипертонические состояния, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, цирроз печени, прием нейролептиков и транквилизаторов, детский возраст до 14 лет.

**Предостережения при применении.** *Перед применением взболтать.* В период применения препарата (внутри) следует избегать потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстрых двигательных и психических реакций (управление транспортными средствами и механизмами).

**Взаимодействие с лекарственными средствами.** Так как ПРОСТАТОФИТ содержит спирт этиловый 70%, возможно потенцирование действия снотворных и седативных препаратов, транквилизаторов.

**Способ применения и дозы.** *Если Вы принимаете любые другие лекарственные средства, обязательно сообщите об этом Вашему врачу.*

ПРОСТАТОФИТ применяют внутрь из расчета 5 – 10 мл (1 – 2 чайные ложки) на 80 – 120 мл (1/3 – 1/2 стакана) воды 2 – 3 раза в день, через час после еды. Высшая разовая доза при приеме внутрь, составляет 10 мл (2 чайные ложки); максимальная суточная – 20 мл. Курс лечения составляет 21 день. Кратность курсов определяет врач в зависимости от тяжести течения заболевания и достигнутого эффекта лечения.

Для усиления терапевтического эффекта наряду с применением ПРОСТАТОФИТА внутрь его назначают ректально (разведение 1:20). ПРОСТАТОФИТ в виде микроклизм применяют 1 раз в сутки (лучше всего на ночь) ежедневно в течение 2 – 3 недель в зависимости от течения заболевания. Для микроклизм 5 мл препарата разводят в 100 мл (1/2 стакана) теплой воды (35 – 40 °С).

*Ни в коем случае не превышайте дозу и продолжительность приема препарата, указанную в листке-вкладыше или назначенную Вам врачом!*

**Побочные эффекты.** Возможны аллергические реакции (крапивница, зуд). *В случае появления каких-либо необычных реакций, проконсультируйтесь с Вашим врачом.*

**Срок годности.** 2 года. Не применять препарат после окончания указанного на упаковке срока годности.

**Условия хранения.** Хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С. Допускается наличие осадка.

**Упаковка.** По 100 мл в банках стеклянных; по 100 мл в банках полимерных; по 100 мл во флаконах полимерных.

**Правила отпуска.** Без рецепта.

**Название и адрес производителя.** ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ».

Украина, 61091, г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20.



## ПРОСТАТОФІТ

Настойка складна

### ЛИСТОК-ВКЛАДИШ. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТА

*Уважно прочитайте цей листок-вкладиш перед тим, як розпочати застосування препарату!  
Зберігайте цей листок-вкладиш. Вам може знадобитися перечитати його.  
Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, обов'язково проконсультуйтеся з Вашим лікарем.*

#### Склад лікарського засобу:

*діючі речовини:* 1 мл настойки складної містить біологічно активні речовини з суміші рослинної сировини:

коренів кропиви .....	0,04 г;	трави пустирника .....	0,02 г;
кореневищ айру .....	0,02 г;	бруньок березових .....	0,02 г;
квіток ромашки .....	0,02 г;	плодів софори японської .....	0,02 г;
трави буркуну .....	0,02 г;	листя шавлії .....	0,02 г;
трави чистотілу .....	0,02 г;		

*допоміжні речовини:* спирт етиловий 70%.

**Лікарська форма.** Настойка складна.

**Фармакогетерапевтична група.** Засоби, що застосовуються при доброякісній гіпертрофії передміхурової залози.

**Фармакологічні властивості.** Комбінація біологічно активних речовин препарату ПРОСТАТОФІТ впливає на обмін речовин у передміхуровій залозі і коригує уродинаміку. ПРОСТАТОФІТ має протизапальну, анагетичну і спазмолітичну дію, а також помірну антиандрогенну активність при підвищеному (але не нормальному) рівні андрогенів.

**Показання.** ПРОСТАТОФІТ застосовують для лікування хронічних простатитів, у комплексній терапії початкової стадії доброякісної гіперплазії передміхурової залози, а також неспецифічних запальних захворювань сечовивідних шляхів; для профілактики порушень функції передміхурової залози і уродинаміки, зумовлених віком.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до компонентів препарату. При прийомі внутрішньо: хронічний алкоголізм, непереносимість алкоголю, гіперацидні стани, виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки, цироз печінки, прийом нейролептиків і транквілізаторів, дитячий вік до 14 років.

**Застереження при застосуванні.** *Перед застосуванням збовтати.* У період застосування препарату (внутрішньо) слід утримуватися від потенційно небезпечних видів діяльності, що потребують підвищеної уваги та швидких рухових і психічних реакцій (керування транспортними засобами та механізмами).

**Взаємодія з лікарськими засобами.** Оскільки ПРОСТАТОФІТ містить спирт етиловий 70%, можливо потенціювання дії снотворних і седативних препаратів, транквілізаторів.

**Спосіб застосування та дози.** *Якщо Ви приймаєте будь-які інші лікарські засоби, обов'язково повідомте про це Вашого лікаря.*

ПРОСТАТОФІТ застосовують внутрішньо, з розрахунку 5 – 10 мл (1 – 2 чайні ложки) на 80 – 120 мл (1/3 – 1/2 склянки) води 2 – 3 рази на день, через годину після їди. Вища разова доза при прийомі внутрішньо становить 10 мл (2 чайні ложки); максимальна добова – 20 мл. Курс лікування становить 21 день. Курс лікування можна повторити через 2 тижні. Кратність курсів визначає лікар залежно від тяжкості перебігу захворювання та досягнутого ефекту лікування.

Для посилення терапевтичного ефекту поряд із застосуванням ПРОСТАТОФІТУ внутрішньо його призначають ректально (розведення 1:20). ПРОСТАТОФІТ у вигляді мікроклізм застосовують 1 раз на добу (найкраще на ніч) щодня протягом 2 – 3 тижнів, залежно від перебігу захворювання. Для мікроклізм 5 мл препарату розводять у 100 мл (1/2 склянки) теплої води (35 – 40 °С).

*Ні в якому разі не перевищуйте дозу та тривалість прийому препарату, зазначену в листку-вкладиші або призначену Вам лікарем!*

**Побічні ефекти.** Можливі алергічні реакції (кропивниця, свербіж). *У випадку появи будь-яких незвичних реакцій проконсультуйтеся з Вашим лікарем.*

**Термін придатності.** 2 роки. Не застосовувати препарат після закінчення зазначеного на упаковці терміну придатності.

**Умови зберігання.** Зберігати у захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Допускається наявність осаду.

**Упаковка.** По 100 мл в банках скляних; по 100 мл в банках полімерних; по 100 мл у флаконах полімерних.

**Правила відпуску.** Без рецепта.

**Назва та адреса виробника.** ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ». Україна, 61091, м. Харків, вул. Харківських дивізій, 20.