



ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного средства

ИММУНОФИТ

Состав:

действующие вещества: 1 фильтр-пакет (2 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья:

эхинацеи пурпурной корней (<i>Echinaceae purpureae radix</i>)	340 мг,
леuzeи корней (<i>Leuzeae radix</i>)	340 мг,
шиповника плодов (<i>Rosae pseudo-fructus</i>)	340 мг,
одуванчика лекарственного корней (<i>Taraxaci officinalis radix</i>)	280 мг,
девясилы корней (<i>Inulae helenii radix</i>)	280 мг,
солодки корней (<i>Liquiritiae radix</i>)	280 мг,
aira корней (<i>Calami radix</i>)	140 мг.

Лекарственная форма. Сбор.

Основные физико-химические свойства: смесь кусочков различной формы серовато-зеленого цвета с коричнево-красными, оранжевыми, желтыми и белыми включениями. Запах слабый, приятный.

Фармакотерапевтическая группа.

Тонизирующие средства. Код АТХ А13А.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Препарат оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему, повышает трудоспособность, обладает адаптогенными свойствами и повышает резистентность организма к воздействию физических и психических факторов. Улучшает аппетит и пищеварение, нормализует обмен веществ. Обладает спазмолитическим действием.

Клинические характеристики.

Показания. Профилактика простудных заболеваний. В комплексной терапии астенических состояний, физическом и умственном переутомлении; после перенесенных истощающих соматических или инфекционных заболеваний, при алкоголизме, для повышения работоспособности при экстремальных условиях труда, а также при ухудшении аппетита.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к каким-либо компонентам препарата. Аллергия к растениям семейства астровых (Compositae/Asteraceae), туберкулез, иммуносупрессия (онкологические заболевания), аутоиммунные заболевания (коллагенозы, рассеянный склероз), заболевания лейкоцитарной системы крови (лейкоз, агранулоцитоз), иммунодефицит (СПИД/ВИЧ-инфекция), ревматизм, тромбофлебит, острая и хроническая почечная недостаточность, острая и хроническая печеночная недостаточность, цирроз печени, холестатические расстройства, гипокалиемия, повышенное нервное возбуждение, артериальная гипертензия III степени, органические поражения сердца (миокардит, перикардит, инфаркт миокарда), тяжелая степень ожирения.

Особые меры безопасности. Следует с осторожностью применять при повышенной свертываемости крови и большом сахарном диабете.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

При длительном применении одновременно с сердечными гликозидами, адренортикостероидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), слабительными средствами, тиазидными и петлевыми диуретиками возможно нарушение водно-электролитного баланса.

В результате иммуностимулирующего действия эхинацеи может снизиться эффективность препаратов, оказывающих иммунодепрессивное действие.

Не рекомендуется применять одновременно с препаратами, которые оказывают гепатотоксическое действие: амидарон, метотрексат,

кетоконазол и стероидные препараты.

Особенности применения. Не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени (более 8 недель).

Применение в период беременности или кормления грудью. В связи с отсутствием достаточного опыта применения препарата в период беременности его не следует применять у данной категории пациентов. При необходимости применения препарата в период лактации следует прекратить кормление грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Способ применения и дозы. 2 фильтр-пакета залить 150 мл кипятка, настоять в закрытой посуде в течение 15 минут.

Взрослым и детям с 12 лет принимать в теплом виде по 150 мл за 20-30 минут до еды 3 раза в сутки (последний прием – не позднее 17 часов).

Длительность применения устанавливает врач. Обычно курс лечения составляет 15-20 дней.

При необходимости по назначению врача курс лечения можно повторить.

Дети. Препарат противопоказан детям до 12 лет.

Передозировка. Возможно усиление проявлений побочных реакций, а также тошнота, рвота, нарушение со стороны пищеварительного тракта, повышенная возбудимость, нарушение сна.

Побочные реакции. Препарат обычно хорошо переносится пациентами и до сих пор не вызывал побочных реакций. Однако, учитывая многокомпонентный состав препарата, из литературных источников известно, что применение отдельных его компонентов, в частности корней эхинацеи пурпурной, может вызывать аллергические реакции в виде покраснения или отека кожи, высыпаний, зуда, крапивницы, ангионевротического отека, затруднения дыхания, анафилактического шока, синдрома Стивенса-Джонсона; лейкопению (при одновременном приеме). В редких случаях возможна тошнота, рвота, диарея, которые исчезают после прекращения применения препарата. Также длительное применение корней солодки (более 8 недель) в чрезмерных дозах может привести к нарушению водно-электролитного баланса (образование отеков, развитие гипокалиемии, повышение артериального давления). Поэтому, несмотря на то, что сбор ИММУНОФИТ содержит небольшие количества каждого из компонентов, в отдельных случаях, как правило, при индивидуальной гиперчувствительности к компонентам препарата или нарушении рекомендованного режима приема вышеуказанные проявления не исключены.

В случае появления каких-либо негативных реакций необходимо обратиться к врачу.

Срок годности. 2 года. Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения. В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С и недоступном для детей месте.

Упаковка. По 2 г в фильтр-пакете № 20.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭИМ».

Местонахождение производителя и его адреса места осуществления деятельности. Украина, 61091, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20 лит. «А-5».

Дата последнего пересмотра. 12.05.2016.



ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ІМУНОФІТ

Склад:

діючі речовини: 1 фільтр-пакет (2 г) містить суміш лікарської рослинної сировини:

ехінацеї пурпурової коренів (<i>Echinaceae purpureae radix</i>)	340 мг,
левзеї коренів (<i>Leuzeae radix</i>)	340 мг,
шипшини плодів (<i>Rosae pseudo-fructus</i>)	340 мг,
кульбаби лікарської коренів (<i>Taraxaci officinalis radix</i>)	280 мг,
оману коренів (<i>Inulae helenii radix</i>)	280 мг,
солодки коренів (<i>Liquiritiae radix</i>)	280 мг,
аїру коренів (<i>Calami radix</i>)	140 мг.

Лікарська форма. Збір.

Основні фізико-хімічні властивості: суміш шматочків різної форми сірувато-зеленого кольору з коричнево-червоними, оранжевими, жовтими і білими включеннями. Запах слабкий, приємний.

Фармакотерапевтична група.

Тонізуючі засоби. Код АТХ А13А.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Препарат чинить стимулюючу дію на центральну нервову систему, підвищує працездатність, має адаптогенні властивості і підвищує резистентність організму до впливу фізичних і психічних факторів. Поліпшує апетит і травлення, нормалізує обмін речовин. Має спазмолітичну дію.

Клінічні характеристики.

Показання. Профілактика застудних захворювань. У комплексній терапії астеничних станів, фізичної та розумової перевтоми; після перенесених виснажливих соматичних або інфекційних захворювань, при алкоголізмі, для підвищення працездатності при екстремальних умовах праці, а також при погіршенні апетиту.

Противоказання. Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату. Алергія до рослин родини айстрових (Compositae/Asteraceae), туберкульоз, імуносупресія (онкологічні захворювання), аутоімунні захворювання (колагенози, розсіяний склероз), захворювання лейкоцитарної системи крові (лейкоз, агранулоцитоз), імунodefіцит (СНІД/ВІЛ-інфекція), ревматизм, тромбоемблія, гостра та хронічна ниркова недостатність, гостра та хронічна печінкова недостатність, цироз печінки, холестатичні розлади, гіпокаліємія, підвищене нерве збудження, артеріальна гіпертензія III ступеня, органічні ураження серця (міокардит, перикардит, інфаркт міокарда), тяжкий ступінь ожиріння.

Особливі заходи безпеки. Слід з обережністю застосовувати при підвищеному згортанні крові та хворим на цукровий діабет.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. При тривалому застосуванні одночасно з серцевими глікозидами, адренкортикостероїдами, антиаритмічними препаратами (хінідин), проносними засобами, тіазидними та петльовими діуретиками можливе порушення водно-електролітного балансу.

Унаслідок імуностимулюючої дії ехінацеї може знизитися ефективність препаратів, що мають імунодепресивну дію.

Не рекомендується застосовувати одночасно з препаратами, що мають гепатотоксичну дію: аміодарон, метотрексат, кетоконазол та стероїдні препарати.

Особливості застосування. Не рекомендується застосовувати препарат протягом тривалого часу (більше 8 тижнів).

Застосування у період вагітності або годування груддю. У зв'язку з відсутністю достатнього досвіду застосування препарату в період вагітності його не слід застосовувати у даної категорії пацієнтів. При необхідності застосування препарату у період лактації слід припинити годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози. 2 фільтр-пакети залити 150 мл окропу, настояти у закритому посуді протягом 15 хвилин.

Дорослим та дітям віком від 12 років приймати у теплом вигляді по 150 мл за 20-30 хвилин до їди 3 рази на добу (останній прийом – не пізніше 17 години).

Тривалість застосування визначає лікар. Зазвичай курс лікування становить 15-20 днів. При необхідності за призначенням лікаря курс лікування можна повторити.

Діти. Препарат протипоказаний дітям віком до 12 років.

Передозування. Можливе посилення проявів побічних реакцій, а також нудота, блювання, порушення з боку травного тракту, підвищена збудливість, розлади сну.

Побічні реакції. Препарат зазвичай добре переноситься пацієнтами та досі не викликав побічних реакцій. Однак, враховуючи багатоконпонентний склад препарату, з літературних джерел відомо, що застосування окремих його компонентів, зокрема коренів ехінацеї пурпурової, може спричинити алергічні реакції у вигляді почервоNINGЯ або набряку шкіри, висипань, свербіжжя, кропив'янки, ангіоневротичного набряку, утруднення дихання, анафілактичного шоку, синдрому Стівенса-Джонсона; лейкопенію (при довготривалому вживанні). У рідкісних випадках можлива нудота, блювання, діарея, які минають після припинення застосування препарату. Також тривале застосування коренів солодки (більше 8 тижнів) у надмірних дозах може призвести до порушення водно-електролітного балансу (утворення набряків, розвиток гіпокаліємії, підвищення артеріального тиску). Тому, незважаючи на те, що збір ІМУНОФІТ містить невеликі кількості кожного з компонентів, в окремих випадках, як правило, при індивідуальній гіперчутливості до компонентів препарату або порушенні рекомендованого режиму прийому вищезазначені прояви не виключені.

У випадку появи будь-яких негативних реакцій необхідно звернутися до лікаря.

Термін придатності. 2 роки. Не застосовувати після завершення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 2 г у фільтр-пакеті № 20.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕІМ».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності. Україна, 61091, Харківська обл., м. Харків, вул. Харківських дивізій, 20 літ. «А-5».

Дата останнього перегляду. 12.05.2016.