



ИНСТРУКЦИЯ для медицинского применения препарата ВУНДЭХИЛ

СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА.

Действующие вещества: 1 г мази содержит софоры японской настойки (1:2) 30 мг, лопуха настойки (1:5) 20 мг, тысячелистника настойки (1:5) 20 мг, прополиса настойки (1:10) 50 мг, карофила 30 мг;

вспомогательные вещества: масло подсолнечное рафинированное, воск пчелиный, жир свиной (нутряной), ланолин безводный.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА. Мазь. Мазь желто-коричневого цвета, с легким специфическим запахом.

НАЗВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭИМ». Украина, 61091, г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА. Средства для лечения ран и язвенных поражений. Код АТС D03A X50**.

Фармакологические свойства. Комбинация биологически активных веществ мази ВУНДЭХИЛ обеспечивает высокоэффективное противовоспалительное, бактерицидное и заживляющее действие на пораженные ткани и слизистые оболочки, быстро снимает боль, отечность, интенсивно удаляет некротические (гнойные) образования, способствует нормализации обменных процессов и быстрой регенерации (заживлению) тканей.

Одновременно с ранозаживляющим и противовоспалительным действием мазь ВУНДЭХИЛ обладает антимикробными (бактериостатическими) свойствами, благодаря чему препятствует инфицированию раны внутрибольничными штаммами инфекций.

Практически во всех случаях применения мазь ВУНДЭХИЛ заживляет раны с образованием нежной рубцовой ткани.

Благодаря тому, что мазь изготовлена на липофильной основе, она препятствует присыханию повязки к местам повреждения тканей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Раны различного происхождения, такие как: вялозаживающие раны (воспаленные и инфицированные, послеоперационные, в т.ч. после операций на прямой кишке), поражения кожи, вызванные облучением, травматические повреждения мягких тканей, язвы (варикозные и диабетические), кровоизлияния в мягкие ткани (гематомы), термические ожоги, пролежни, гинекологические эрозии, псориаз, нейродермиты, кератодермии ладоней и подошв, гиперкератотические формы микоза. Заживление трещин сосков в период кормления грудью.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ. Противопоказаний к применению в периоды беременности и кормления грудью нет. Препарат применяется во всех возрастных группах.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ. Рекомендуется наносить мазь на пораженную поверхность тонким слоем 2-3 раза в сутки. Через 2-3 часа после нанесения мазь нужно смыть раствором фурацилина или настоек календулы (1:3) и подождать, пока рана подсохнет. Продолжительность курса лечения зависит от характера патологического процесса, площади пораженных участков, достигнутого эффекта. При ранах, вызванных механическими и термическими повреждениями тканей, лечебный эффект препарата проявляется в течение 2-7 дней применения.

При лечении хронических анальных трещин и геморроя ежедневно на 2-3 часа вводят в просвет кишки тампончик с мазью. Продолжительность курса лечения зависит от степени и формы заболевания (от 5 дней до 1 месяца).

При лечении эрозии шейки матки мазь густо наносится на ватный или марлевый тампон и вводится на 2-3 часа глубоко во влагалище (ежедневно). Курс лечения – от 1 до 4 недель.

При термических ожогах для достижения быстрого заживляющего эффекта ВУНДЭХИЛ нужно нанести как можно скорее на пораженную кожу (в течение 10-15 мин после получения ожога). Курс лечения зависит от степени ожога, его площади, и, прежде всего, от времени после получения ожога до первого нанесения мази, и длится от 3 до 15 дней.

При ожогах, вызванных солнечным облучением, мазь нужно нанести тонким слоем на 2-3 часа, после чего с помощью салфетки удалить ее остатки. ВУНДЭХИЛ быстро снимает боль и покраснение кожи.

ПЕРЕДОЗИРОВКА. Невозможна.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ. Возможны аллергические реакции (поражения кожи).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ДРУГИЕ ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ. Взаимодействие мази ВУНДЭХИЛ с другими лекарственными средствами пока не известно.

СРОК ГОДНОСТИ. 2 года. Лекарственное средство не следует применять после окончания указанного на упаковке срока годности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от +8 до +15 °С.

УПАКОВКА. По 15 г, 30 г в тубах.

КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА. Без рецепта.

ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ПРОСМОТРА. 31.10.2007.



ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату ВУНДЕХІЛ

СКЛАД ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ.

Діючі речовини: 1 г мазі містить софори японської настойки (1:2) 30 мг, перстачу настойки (1:5) 20 мг, деревію настойки (1:5) 20 мг, прополісу настойки (1:10) 50 мг, карофілену 30 мг;

допоміжні речовини: олія соняшникова рафінована, віск бджолиний, жир свинячий (нутряний), ланолін безводний.

ЛІКАРСЬКА ФОРМА. Мазь. Мазь жовто-коричневого кольору, з легким специфічним запахом.

НАЗВА І МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВИРОБНИКА. ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ». Україна, 61091, м. Харків, вул. Харківських дивізій, 20.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА. Засоби для лікування ран і виразкових уражень. Код АТС D03A X50**.

Фармакологічні властивості. Комбінація біологічно активних речовин мазі ВУНДЕХІЛ забезпечує високоефективну протизапальну, бактерицидну та загоювальну дію на уражені тканини і слизові оболонки, швидко знімає біль, набряклість, інтенсивно видаляє некротичні (гнійні) утворення, сприяє нормалізації обмінних процесів і швидкої регенерації (загоєнню) тканин.

Разом із ранозагоювальною і протизапальною дією мазь ВУНДЕХІЛ має антимікробні (бактеріостатичні) властивості, завдяки чому перешкоджає інфікуванню рани внутрішньолікарняними штамми інфекцій.

Практично в усіх випадках застосування мазь ВУНДЕХІЛ загоєю рани з утворенням ніжної рубцевої тканини.

Завдяки тому, що мазь виготовлена на ліпофільній основі, вона перешкоджає присиханню пов'язки до місць ушкодження тканин.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ. Рани різного походження, такі як: рани, що повільно загоюються (запалені й інфіковані, післяопераційні, у т.ч. після операцій на прямій кишці), ураження шкіри, спричинені опроміненням, травматичні ушкодження м'яких тканин, виразки (варикозні та діабетичні), крововиливи в м'які тканини (гематоми), термічні опіки, пролежні, гінекологічні ерозії, псоріаз, нейродерміти, кератодермії долонь і підшов, гіперкератичні форми мікозу. Загоєння тріщин сосків у період годування груддю.

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Протипоказань для застосування у періоди вагітності та годування груддю немає. Препарат застосовується в усіх вікових групах.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ. Рекомендується наносити мазь на уражену поверхню тонким шаром 2-3 рази на добу. Через 2-3 години після нанесення мазь треба змити розчином фурациліну або настояю нагідок (1:3), дати час, щоб рана підсохла. Тривалість курсу лікування залежить від характеру патологічного процесу, площі уражених ділянок, досягнутого ефекту. При ранах, спричинених механічними та термічними ушкодженнями тканин, лікувальний ефект препарату виявляється протягом 2-7 днів застосування.

При лікуванні хронічних анальних тріщин і геморою щоденно на 2-3 години вводять у просвіт кишки тампончик з маззю. Тривалість курсу лікування залежить від ступеня та форми захворювання (від 5 днів до 1 місяця).

При лікуванні ерозії шийки матки мазь густо наноситься на ватний або марлевий тампон і вводиться на 2-3 години глибоко в піхву (щоденно). Курс лікування – від 1 до 4 тижнів.

При термічних опіках, для досягнення скорішого загоювального ефекту, ВУНДЕХІЛ треба нанести якомога швидше на уражену шкіру (протягом 10-15 хв. після отримання опіку). Курс лікування залежить від ступеня опіку, його площі, і насамперед – від часу після отримання опіку до першого нанесення мазі, та триває від 3 до 15 днів.

При опіках, спричинених сонячним опроміненням, мазь треба нанести тонким шаром на 2-3 години, після чого за допомогою серветки видалити її залишки. ВУНДЕХІЛ швидко знімає біль і почервоніння шкіри.

ПЕРЕДОЗУВАННЯ. Нemoжливе.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ. Можливі алергічні реакції (ураження шкіри).

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ ТА ІНШІ ВИДИ ВЗАЄМОДІЙ. Взаємодія мазі ВУНДЕХІЛ з іншими лікарськими засобами поки що не відома.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ. 2 роки. Лікарський засіб не слід застосовувати після закінчення зазначеного на упаковці терміну придатності.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати в захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі від +8 до +15 °С.

УПАКОВКА. По 15 г, 30 г у тубах.

КАТЕГОРІЯ ВІДПУСКУ. Без рецепта.

ДАТА ОСТАННЬОГО ПЕРЕГЛЯДУ. 31.10.2007.