

# НЕФРОФИТ-СИРОП (Nephrophyt-Syrup)

## **Состав:**

5 мл сиропа содержат:

*действующие вещества:* березы почек экстракта водного (1:5) – 600 мг, спорыша травы экстракта водного (1:5) – 600 мг, хвоща травы экстракта водного (1:5) – 600 мг, шиповника плодов экстракта водного (1:5) – 390 мг;

*вспомогательные вещества:* сахар, кислота лимонная, кислота сорбиновая, вода очищенная.

**Свойства.** Благодаря действию экстрактов лекарственных растений в составе НЕФРОФИТ-СИРОП, обеспечиваются следующие эффекты:

**1. УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.** Совокупное действие всех биологически активных веществ, содержащихся в сиропе, способствует общему улучшению функционирования почек и мочеполовой системы.

**2. УМЕНЬШЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ.** Дубильные вещества травы спорыша, плодов шиповника, почек березы и биологически активные вещества травы хвоща оказывают противовоспалительное действие.

**3. УЛУЧШЕНИЕ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ.** Сапонины почек березы, флавоноиды травы спорыша, хвоща и почек березы, а также фенолоксиолы плодов шиповника оказывают диуретическое (мочегонное) действие, благодаря которому происходит выведение токсинов и общее уменьшение отечности всего тела.

**4. ВЫВЕДЕНИЕ СОЛЕЙ.** Соединения кремния травы спорыша и хвоща и биологически активные вещества почек березы усиливают выведение мочевой кислоты. Кроме того, почки березы повышают растворимость солей кальция.

**5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ МОЧИ.** Соединения кремниевой кислоты травы спорыша и хвоща препятствуют образованию песка и мочевых камней.

**Рекомендации по применению.** Рекомендуется употреблять НЕФРОФИТ-СИРОП как источник биологически активных веществ. Способствует улучшению функционирования почек и мочеполовой системы. Обладает мягкими мочегонными свойствами. Рекомендуется как противовоспалительное, спазмолитическое, литолитическое (способствует растворению мочевых конкрементов) и общеукрепляющее средство для профилактики и в комплексной терапии циститов, мочекаменной болезни, заболеваний органов малого таза и воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих путей, сопровождающихся снижением мочевыделительной и азотовыделительной функции.

**Способ применения и дозы.** Принимать детям с 3 до 7 лет по 5 мл три раза в день; детям с 7 до 14 лет – по 5-10 мл три раза в день; взрослым и детям с 14 лет – по 10 мл 3-5 раз в день. Можно растворять в теплой воде или добавлять в чай. Курс приема: 3-4 недели. Курс можно повторять с перерывом в 10 дней. Перед употреблением взболтать.

Перед применением рекомендуется посоветоваться с врачом.

**Предостережения при применении.** Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам, беременность и период кормления грудью, возраст до 3 лет, сахарный диабет.

*Добавка диетическая. Не является лекарственным средством!*

**Форма выпуска.** Сироп во флаконах полимерных по 150 мл.

**Условия хранения.** Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от + 2 °С до + 25 °С.

**Срок годности.** 24 месяца.

**Производитель.** ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ» по заказу ЧП «Лекраст».